

常見疑義處方案例介紹

TMUH 蔡宜珊

109/12/20

Outline

2

- 藥師在處方中所扮演的角色
- 處方內容
- 處方縮寫用字
- 處方判讀
- 常見處方錯誤之型態
- 如何增進處方判讀能力
- 全民健康保險藥品給付規定
- 問題處方之處理
- 範例

藥師在處方中所扮演的角色

優良藥品調劑作業規範（GDP）

第一章、總則

二、依據政府所頒定之優良藥品調劑作業準則，**調劑**，係指藥師、藥劑生（以下簡稱藥事人員）於調劑處所從**接受醫師處方箋到病人取得藥品**之間所為之調劑作業。其過程包括**處方確認、處方登錄、用藥適當性評估、藥品調配或調製、再次核對、交付藥品及用藥指導，以及其他與藥品調劑有關之行為。**

第二章、藥事人員

- 九、藥事人員應與醫師及其他醫事服務人員，**建立互相信賴的合作關係，共同處理各種藥物供應、調劑與治療方面**的問題。
- 十、藥事人員應提供病患諮詢服務及藥事照護相關業務。
- 十一、藥事人員應依法參與繼續教育課程，並定期更新執業執照。
- 十二、藥事人員發現病人有**疑似藥物治療問題**時，應**主動與醫師溝通或教育病人，並追蹤配合處理**；若發現**藥品不良反應**時，應向主管機關規定之監視通報系統通報。

藥師在處方中所扮演的角色

第四章、調劑設備

二十五、調劑處所應視調劑作業需要，備有下列設備及器具：

- 〈一〉調製製劑時，應有藥盤、藥匙、符合藥典規定之調劑用水、藥膏板、調藥刀、攪棒、杵、研鉢、其他適當器皿、調劑用天平（秤）、量筒或量杯。
- 〈二〉藥品冷藏用冰箱（其內應置溫度計）應保持整潔，冰箱內不得存放食物。
- 〈三〉宜備有兒童安全包裝容器，或七日藥盒。
- 〈四〉宜使用電腦及印表機等設備列印藥袋、調劑標示及注意事項，或另備其他相關注意事項標籤。
- 〈五〉宜建立電腦化病人用藥檔案，並使用二維條碼機讀取處方箋資訊；有讀卡機能將調劑藥品資訊登錄於病人健保 IC 卡上。
- 〈六〉宜具備處方箋上傳至全民健康保險署之設備與網路線。

二十六、調劑用具每次使用前必須妥當清潔以避免不同藥品相互污染。

藥師在處方中所扮演的角色

5

- 病患與醫師、護理人員之間的溝通
- 用藥把關的最後一道防線
- 基本衛教 (Ex: 吸入劑、陰道塞劑、鼻噴劑等)




Outline

6

- 藥師在處方中所扮演的角色
- 處方內容
- 處方縮寫用字
- 處方判讀
- 常見處方錯誤之型態
- 如何增進處方判讀能力
- 全民健康保險藥品給付規定
- 問題處方之處理
- 範例

處方內容

7



處方內容- 一般處方

8

Scr: 0.5 mg/dl
健保欠卡
臺北醫學大學附設醫院
處方箋暨繳費通知單
第1頁,共1頁

看診日期: 103/12/26 批價單號: O324-16907 病歷號: 1331-9
姓名: 李 身分證: M22-476 性別: 女 年齡: 25歲1個月
生日: 民國 078/1 科別: 內分泌科 醫師: 林志弘 體重 85.0 kg
診斷: 1. DIABETES MELLITUS WITHOUT MENA.
2.
3.

藥品名稱	次量	單位	用法	頻率	天	總量	單位	自註
Metformin/Placebo 50 (Metformin)	2	Tab	PO	BID	28	3	Bot	C N
MK-3102/Placebo 25r (MK-3102)	1	Cap	PO	QW	28	2	Bot	C N

共2筆

Objective :
已參閱就醫病摘
BH 171 cm; BW 85.3 <- 87 kg
BP 108/68 mmHg; PR 77 bpm

LAB
2013-11 AC 160; T-CHO 226; TG 266; Cre 0.5; ALT 22
2013-12 AC/PC 144/170; HbA1c 7.2
2014-01 central lab data grossly OK

藥物過敏史		
學名	商品名	ADR描述
無藥物過敏		

MDR: 1226

領藥號: *為保障病患用藥安全, 請憑處方箋於3天內領藥
請攜帶本單至第三大樓一樓批價櫃檯或其他臨近櫃檯結帳
本院地址: 臺北市信義區吳興街252號 電話: (02)2737-2181

收據章: 臺北醫學大學附設醫院 收據章 020361 02037109

QR Code

優良藥品調劑作業規範(GDP)

第六章、藥品調劑作業

三十六、藥事人員應確認處方箋的合法性、完整性與處方期限有效性。應確認處方箋有包括下列各項：

- 〈一〉 病人的姓名、年齡、性別、診斷。
- 〈二〉 處方醫師姓名、執業執照或管制藥品使用執照號碼及簽名或蓋章，醫療院所名稱地址、電話。
- 〈三〉 藥品之名稱、劑型、單位含量。
- 〈四〉 藥品數量。
- 〈五〉 劑量與用藥指示。
- 〈六〉 開立處方日期。
- 〈七〉 連續處方指示，包括連續處方的調劑次數及時間間隔。

處方內容-連續處方箋

9

全民健康保險門診慢性病連續處方箋(第二次) 第1頁,共1頁

特約服務機構 臺北醫學大學附設醫院
代號及名稱 170017

姓名: 身份證字號: 3171556 出生日期: 043年 12月 06日
就醫科別: 血液腫瘤 就醫日期: 109年06月16日 健保卡號: 0004(AAD)
病歷號: 12--7 批價序號: O90681421

診斷及疾病分類碼: D69.8 其他特定之出血性傾向
診斷及疾病分類碼: D53.9 營養性貧血
診斷及疾病分類碼: D75.9 血液與造血器官疾病
免部分負擔代碼及原因:

計價	藥品名稱及規格(劑型,劑量)	用法	用量	頻率	天數	總數量	健保碼
健保	Allegro 60mg (跌)艾來 (Fexofenadine HCl)	PO	1	QD	28	28 Tab	BC23016100
健保	Concor 5mg (跌)康哥 (Bisoprolol)	PO	1	QD	28	28 Tab	BC17125100
健保	Exforge-FC Tab 5/160mg (跌) #易(5/160)mg (Amlodipine besylate/Valsartan)	PO	1	QD	28	28 Tab	BC25072100
健保	Hydrea★500 mg 愛治(抗腫瘤) 500 mg/cap (Hydroxyurea)	PO	1	QD	28	28 Cap	BC23135100

*第一次已在本院領藥。本處方共可再調劑 2、3次,本張為第2次。
有效期限至 109年 09月 08日,逾期無效。

診察醫師 處方醫院
簽章: 核章:
北醫附設醫院
1301170017
門診章

第2次可領藥日
109/07/05至 109/07/14
第 2 次
門診章(2)

注意事項:
(一)醫師已幫您預約 年 月 日回診,若因故無法回診,請重新預約。
(二)請先持健保卡及本處方箋至「批價櫃檯」或「自助提藥機」批價。
(限領藥起訖日區間內領藥),取得領藥號後,再至藥局3號櫃檯依領藥號領藥。
如您有自費藥品,藥品價格可能變動,尚祈見諒。
(三)回本院領藥免掛號費,且藥品管理嚴謹,可杜絕偽藥、劣藥,確保用藥安全。
(四)服藥期間病情如有變化請立即就醫。處方箋遺失或逾有效期限【不得補印】。
處方箋如不完整或缺頁,亦不可領藥。
(五)領用第三級管制藥品須同時持本處方箋及[管制藥品專用處方箋],方可領藥。
(六)請多利用網路預約領藥,以節省您現場等待之時間。
您可至官網點選預約領藥,或掃描右方QR code。
(七)領藥時間:週一至週五08:30~22:00,週六08:00~15:30
醫院地址:台北市信義區興業路252號 電話:(02)2737-2181,分機:8130

優良藥品調劑作業規範(GDP)

第六章、藥品調劑作業

三十六、藥事人員應確認處方箋的合法性、完整性與處方期限有效性。應確認處方箋有包括下列各項：

- 〈一〉 病人的姓名、年齡、性別、診斷。
- 〈二〉 處方醫師姓名、執業執照或管制藥品使用執照號碼及簽名或蓋章，醫療院所名稱地址、電話。
- 〈三〉 藥品之名稱、劑型、單位含量。
- 〈四〉 藥品數量。
- 〈五〉 劑量與用藥指示。
- 〈六〉 開立處方日期。
- 〈七〉 連續處方指示，包括連續處方的調劑次數及時間間隔。

處方內容-釋出處方箋

10

全民健康保險門診交付調劑處方箋

06109174 0608-08288 第一聯：民眾留存

特約醫院服務機構代號及名稱 台北醫學大學附設醫院 1301170017 一般處方箋 連續處方箋

姓名：張 出生日期：43年 6月 就醫科目：內科 就醫日期：100年 8月 2日 健保卡就醫序號：0007 給藥日份：28天

傷病名稱及主要症狀：710 國際疾病分類碼（一般處方箋免填）：傷病名稱及主要症狀：1027.9 國際疾病分類碼（一般處方箋免填）：免部份負擔代碼及原因：

藥品名稱及規格（劑型、劑量）	用 量 及 用 法	總 數 量	備 註
Diovan (50)	1# qd	28#	
Norvasc (5)	1# qd	28#	
Afemo (50)	1# qd	28#	
Narizin (25) (Cinnarizine)	1# bid	28#	

診治醫師代號： 處方醫院診所 簽章： 聯絡電話：02-27372181 傳真：02-27369438

調劑藥師（生）代號： 簽章： 調劑日期：

注意事項：
 (一) 本處方如有塗改，需由原處方醫師之蓋章確認，否則無效。
 (二) 若同時須開始病患一般（七日內）用藥及連續處方用藥時，須分開填寫再不同的處方箋。

F-8500-004 1050302修

優良藥品調劑作業規範(GDP)

第六章、藥品調劑作業

三十六、藥事人員應確認處方箋的合法性、完整性與處方期限有效性。應確認處方箋有包括下列各項：

- 〈一〉 病人的姓名、年齡、性別、診斷。
- 〈二〉 處方醫師姓名、執業執照或管制藥品使用執照號碼及簽名或蓋章，醫療院所名稱地址、電話。
- 〈三〉 藥品之名稱、劑型、單位含量。
- 〈四〉 藥品數量。
- 〈五〉 劑量與用藥指示。
- 〈六〉 開立處方日期。
- 〈七〉 連續處方指示，包括連續處方的調劑次數及時間間隔。

Outline

II

- 藥師在處方中所扮演的角色
- 處方內容
- 處方縮寫用字
- 處方判讀
- 常見處方錯誤之型態
- 如何增進處方判讀能力
- 全民健康保險藥品給付規定
- 問題處方之處理
- 範例

處方縮寫用字-1

12

縮寫	意義	縮寫	意義
qd	every day	o.d.	right eye
bid	twice a day	o.u.	each eye
t.i.d.	3 times a day	o.s.	left eye
qid	4 times a day	a.d.	right ear
qod	every other day	a.u.	each ear
tiw	three times a week	a.s.	left ear
a.m.	before noon	q.hr	every hour
a.c.	before meals	p.m.	after noon
p.c.	after food	p.r.n.	as occasion arises
h.s.	at bedtime	stat.	Immediately

處方縮寫用字-2

13

縮寫	意義	縮寫	意義
gel.	a gel	susp	suspension
gtt.	drop	cap.	a capsule
inf.	an infusion	supp	suppository
sol.	a solution	IM	intramuscular
syr.	syrup	p.o.	by mouth
tab.	Tablet	EXT.	Externus
Vac.	A vaccine	amp	an ampule

Outline

14

- 藥師在處方中所扮演的角色
- 處方內容
- 處方縮寫用字
- 處方判讀
- 常見處方錯誤之型態
- 如何增進處方判讀能力
- 全民健康保險藥品給付規定
- 問題處方之處理
- 範例

處方判讀

15

優良藥品調劑作業規範(GDP)

三十九、藥事人員於調劑前應對處方用藥做適當性評估，包括下列各項：

- 〈一〉病人是否會對處方上的藥品過敏。
- 〈二〉用藥目的。(適應症)- 病患年齡, 性別
- 〈三〉劑量、頻次。小兒, 老年人, 肝/腎功能不良者之劑量調整
- 〈四〉劑型與給藥途徑。含不宜分割或磨粉之藥品
- 〈五〉療程。
- 〈六〉目前所有用藥是否有重複給藥現象。藥理作用
- 〈七〉目前所有用藥是否有交互作用情形。micromedex
- 〈八〉其他。
 - 藥物與疾病之禁忌(含孕婦用藥安全性)
 - 病人資料錯誤, 保險給付規定等

四十、藥事人員經依前條用藥適當性評估後，認為有疑似藥物治療問題之虞時，應啟動判斷性服務，主動與開立處方的醫師聯絡，請其確認或重新開立處方。前項過程皆應記錄在處方箋或加註於判斷性服務(藥物治療問題專用)紀錄表上，並註明與醫師討論的時間。

處方判讀-病人是否會對處方上的藥品過敏

16

Scr: 0.7 mg/dl 臺北醫學大學附設醫院 第1頁,共1頁
健保欠卡 處方箋暨繳費通知單 (修正)1
看診日期: 104/01/02 批價序號: O401-02517 病歷號: 061366
姓名: 陳 (防跌) 身分證: A2027498 性別: 女 年齡: 78歲6個月
生日: 民國 025/0 科別: 骨科 醫師: 謝銘勳 體重 78.0 kg
診斷: 1. PAIN IN JOINT 4.
2. OSTEOARTHRITIS, LOCALIZED, PRI 5.
3. 6.

藥品名稱	次量	單位	用法	頻率	天	總量	單位	自調
注 Xylocaine 1%, 5ml 息痛卡 (Lidocaine)	1 Vial	IM	STAT		1	1 Vial	H N	
注 Shincort 40mg/ml 信可得 (Triamcinolone)	1 Amp	IM	STAT		1	1 Amp	N N	
Focus Gel 40gm/tube 伏加 (Piroxicam)	1 qs	TOPI	STAT		28	1 Tube	N N	

共3筆

Objective:
已參閱就醫病摘
trigger thumb rt thumb

學名	商品名	ADR描述
atorvastatin	LIPITOR 20mg 立普妥	TEMPORAL PAIN

藥物過敏史

MDR: 1262

領藥號: 

*為保障病患用藥安全,請憑處方箋於3天內領藥
請攜帶本單至第三大樓一樓批價櫃檯或其他臨近櫃檯結帳
本院地址: 臺北市信義區吳興街252號 電話: (02)2737-2181 

臺北醫學大學附設醫院 用藥紀錄卡

填卡日期: 104/01/02 17:19:11 領藥號 1262

看診日期: 104/01/02

姓名: 陳

病歷號: 06136635

看診科別: 骨科

性別: 女 生日: 025/06/26(78)

診斷: 關節痛
原發性局部骨關節病

我對下列藥物有不良反應:
1 LIPITOR 20mg 立普妥

我的用藥紀錄:

1 Shincort 40mg/ml 信可得注射液 (Triamcinolone)	立即使用	/每次1 安瓶(Amp)
2 Xylocaine 1%, 5ml 息痛卡因注射劑 (Lidocaine)	立即使用	/每次1 小瓶 (vial)
3 Focus Gel 40gm/tube 伏加斯 凝膠 (Piroxicam)	立即使用	/每次1 適量

這是您於本院的用藥紀錄,看病或住院時,請主動出示本卡。
(本卡片不作藥品調劑用)

處方判讀-病人是否會對處方上的藥品過敏

17

◆ 健保醫療資訊雲端查詢系統



- 105年基於其推動基礎及參考使用者回饋意見及臨床實務需求，再升級為「健保醫療資訊雲端查詢系統」(下稱健保雲端查詢系統)，提供醫師於臨床處置、開立處方及藥事人員調劑或用藥諮詢時，可查詢病人過去的就醫資訊，可查詢項目包含西醫、中醫用藥紀錄、檢查檢驗紀錄與結果、手術明細紀錄、牙科處置及手術紀錄、過敏藥物紀錄、特定管制藥品用藥紀錄、特定凝血因子用藥紀錄、復健醫療紀錄、出院病歷摘要及CDC預防接種等12項資訊。
- 自107年1月起健保署再精進系統功能，發展醫療影像上傳及調閱查詢之互享機制，提供使用者查詢電腦斷層(CT)、磁振造影(MRI)、超音波、鏡檢及X光等醫療檢查影像。

處方判讀

18

優良藥品調劑作業規範(GDP)

三十九、藥事人員於調劑前應對處方用藥做適當性評估，包括下列各項：

- 〈一〉病人是否會對處方上的藥品過敏。
- 〈二〉用藥目的。(適應症)- 病患年齡, 性別
- 〈三〉劑量、頻次。小兒, 老年人, 肝/腎功能不良者之劑量調整
- 〈四〉劑型與給藥途徑。含不宜分割或磨粉之藥品
- 〈五〉療程。
- 〈六〉目前所有用藥是否有重複給藥現象。藥理作用
- 〈七〉目前所有用藥是否有交互作用情形。micromedex
- 〈八〉其他。
 - 藥物與疾病之禁忌(含孕婦用藥安全性)
 - 病人資料錯誤, 保險給付規定等

處方判讀

19

三十八、藥事人員應建立並登錄病人用藥資料，儘可能採用二維條碼讀取處方資訊，並以電腦建立藥歷檔案。此處方登錄資料應包括下列各項：

- 〈一〉 調劑日期。
- 〈二〉 處方號碼。
- 〈三〉 藥品之名稱、品牌、劑型、單位含量、藥品數量。
- 〈四〉 給病患的劑量與用藥指示。
- 〈五〉 處方醫師姓名。
- 〈六〉 連續處方再調劑紀錄。

病患使用之所有藥品宜以電腦輔助檢查各藥品是否有交互作用及任何藥物治療問題存在，並查閱相關藥品資訊。

處方判讀-電腦輔助系統

20

醫療管理系統 (W_MAIN_MENU)

		106/08/07 15:59:56	蔡宜珊
1.門診櫃台	2.病歷系統	3.急診櫃台	7.感控室
4.門診醫令	8.急診醫令	5.血庫	6.門/急診藥局
9.復健科櫃台	A.洗腎室	B.門診申報	C.個案管理
F.手術室	I.X光室	J.檢查中心	W.營養系統
K.檢驗室	G.日月結處理	H.權限設定	V.癌症中心
R.呼吸照護	M.住院管理	N.住院批價	E.居家照護
O.住院申報	P.住院藥局系統		L.牙科放射
S.住院報表	T.住院醫令(新)	U.護理站作業(新)	
W1.新版營養系統	Z.醫師提成	X.基因定序	0.臨床試驗中心
D.新增報表	r.關防櫃台	轉換碼查詢	E.結束



門急診藥局 (w_o_phar)

		106/08/07 16:00:45	蔡宜珊
1.藥品資料維護作業	4.藥袋查詢/列印作業	7.看診用藥資料查詢作業	
8.計價核准資料維護作業	9.醫師常用檔查詢	B.看診用藥歷史查詢作業	
C.藥品資料品項一覽表	D.藥品基本維護資料一覽表	I.每日藥服費/開方天數統計表	
J.每日藥服費/開方天數月統計表	K.每日藥服費/開方天數年統計表	L.每日處方數統計表	
M.每日處方數統計月報表	N.每日處方數統計年報表	P.單項藥品使用狀況年報表	
S.各身份處方數統計月報表	T.各身份處方數統計年報表	U.急診注射針劑明細表	
X.藥局藥袋週排班作業	Y.藥品管理作業	Z.門診化療處方籤查詢列印	
V.預防接種輸入	2.化療相關作業	E.門診藥袋列印	
F.急診藥袋列印	G.磨粉藥袋列印	H.補印藥袋列印	
O.藥師維護	A.藥品管制作業	Q.藥品緊急採購審核作業	
R.藥局相關報表	W.密碼設定	A4.慢性病處方箋第二次之後未領	
A1.處方審核作業	A2.用藥記錄卡(補印)	A3.發藥確認作業	
A5.門診處方箋(補印)	A6.預約慢箋藥袋列印及補印	a.藥物交互作用維護	
5.ADR描述		c.專案急採用藥維護	
d.醫令藥品審查維護		3.小兒劑量維護	
		E.結束	
a9.藥師人日數維護介面	YH.疫苗批號維護作業		

處方判讀-電腦輔助系統

21

總處方籤核藥bar-code程式v.970327

106/08/07 16:01:23 蔡宜珊

就醫日期 106/08/07 批價序號 S.確認 C.取消 A.過敏史 M.用藥 X.結束

最新待領藥號碼 5002 用藥建議 新增 查詢

病患當次領藥清單

領藥號 姓名 病歷號 處方醫師

診斷

修改	序	藥品代碼	藥品名稱	次量	單位	用法	途徑	天數	總量	自費
☐	1									

交互作用

藥品Cardizem SR 90mg與Linicor F.C.T. 500/20mg#會產生1級交互作用。

重複用藥

1.Loata 50mg與Aspirin Protect 100mg為相同藥理之藥品,不可重覆開立。

交互作用

重複用藥

Outline

22

- 藥師在處方中所扮演的角色
- 處方內容
- 處方縮寫用字
- 處方判讀
- 常見處方錯誤之型態
- 如何增進處方判讀能力
- 全民健康保險藥品給付規定
- 問題處方之處理
- 範例

常見處方錯誤之型態

23

藥品錯誤

規格

劑型

重複

無適應症

需增加藥物

治療禁忌

配伍禁忌

其他

劑量錯誤

過高

過低

給要間隔

治療期間

肝功能

腎功能

藥物交互作用

拮抗

相似

吸收

代謝

藥理不良反應

特殊病人用藥安全

孕婦

哺乳

老人

幼兒

給藥方式錯誤

途徑

使用部位

給藥時間

其他行政

電腦批價錯誤

醫師維持原處方

其他

藥品 錯誤

常見處方錯誤之型態

規格

Montelukast (Singulair®) 4mg → Montelukast (Singulair®) 10mg

劑型

Madopar HBS 125mg → Madopar 250mg (On NG Pt), Dulcolax

重複

Furosemide tab + Furosemide amp ,併用ACEI and ARB

無適應症

Acetazolamide → Acetaminophen ,診斷未列DM而開DM用藥

需增加藥物

Isoniazid+pyridoxine

治療禁忌

COPD give Inderal

配伍禁忌

Amphotericin B 不建議以食鹽水稀釋

其他

屬開錯藥物，但無法歸類於上述分類

劑量 錯誤

25

過高

過低

給藥間隔

治療期間

肝功能

腎功能

常見處方錯誤之型態

臺北醫學大學附設醫院
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

日期/時間: [健保] <門診藥局>
Date / Time: 1030821 11:54 看診日: 1030821 09:18 藥袋數: Package No.: 2 / 11

病歷號: 0950 Medical History No.: 床號: 門診 Bed No.: 領藥號: 0686 Prescription No.:

姓名: 林義 Patient Name: 先生 Gender: 男 生日: 民國 028/ Birth Date: (年齡 74 歲)

用法/用量: 口服 Usage and Dosage: 每天2次早晚使用 配藥天數: 28 日份 Treatment Duration: 1 ml

藥名: Keppra Oral Sol'n Drug Name: 100mg/ml, 300ml/bot' #' 優閒內服液劑 發藥量: 1 瓶 Drug Quantity:

成分名: Levetiracetam Generic Name:

臨床用途: 控制癲癇或痙攣 Clinical Uses:

注意事項: 1. 開封後室溫可保存2個月 2. 藥品可能造成嗜睡或注意力減低。
Precautions:

藥品外觀標記: 棕色玻璃瓶 Drug Appearance:

☒ 早上 (Morning)	☐ 中午 (Noon)	☒ 晚上 (Night)	☐ 睡前 (Bedtime)
☐ 飯前 (Before meals)	☐ 飯後 (After meals)	☐ 一粒	☐ 半粒

常見副作用: 嗜睡、無力感、頭痛、消化不良、口乾、肌肉酸痛
Adverse Effects:

就診科別: 神經外科 Medical Division: 調劑藥師: 林明瑩 藥師 Dispensing Pharmacist:

處方醫師: 蔣永孝 醫師 Prescribing Physician: 覆核藥師: 詹子瑩 藥師 Verified Pharmacist:

劑量 錯誤

過高

過低

給要間隔

治療期間

肝功能

腎功能

常見處方錯誤之型態

20320253103090114460887

臺北醫學大學附設醫院 列印時間: 103/09/01 14:47

領藥單 (藥局聯) 第 1-1 頁

病床號: 2719 姓名: 樂 病歷號: 115 2 性別: 男 年齡: 86
 科別: 血液腫瘤 主治醫師: 蔡佳叡 開單醫師: 蔡佳叡 生日: 017/09/02
 診斷: 1. 帶狀疱疹 2. 其他淋巴瘤 3. 4. 5.
 身高: 0 體重: 0 65 Scr: 1.7 m 領藥號: 0887

醫令日期/時間	囑 型	藥品 名稱	劑量單位	頻次	途徑	自發費藥量
103/09/01 14:44	需	Zovirax cream 2g/tube(外) (Acyclovir)	1.00qs	BID	TOPI Y	1
103/09/01 14:44	首	ZOVIRAX 250mg(針劑) 煎 (Acyclovir)	500.00mg	Q8H	IVD N	6
			NS 100mL	66.7mL/hr	Drip	90mins

註: 長期藥囑首日藥量計算到下次過藥日16:59以前。
 一般過藥日為隔日, 週六過二天。

這是您於本院的用藥紀錄, 看病或住院時, 請主動出示本卡。
 (本卡片不作藥品調劑用)
 24小時藥物諮詢專線 (02)2737-2181 轉 8130、8434

Medical Division: 心臟內科 Prescribing Physician: 高永達
 調劑藥師: 劉邦邑 Dispensing Pharmacist: 陳姿廷

藥物交互作用

27

拮抗

相似

吸收

代謝

藥理不良反應

常見處方錯誤之型態

- Sennoside與Smecta併用
- Ciprofloxacin與Antacid併用
- tamoxifen與Warfarin併用
(因藥物併用所引起之藥物不良反應)
- Moxifloxacin與Amiodarone併用，易造成Q-T interval的延長
- Venlafaxine 與linezolid，易造成serotonin syndrome(藥理不良反應)

特殊病人 用藥安全

28

孕婦

哺乳

老人

幼兒

常見處方錯誤之型態

針對用藥不安全或有治療禁忌者屬此一分類

- 老人、幼兒 劑量錯誤(腎功能不良或體重)
- 孕婦:D、X級藥品用於已懷孕婦女
- 哺乳:Hyperthyroidism之哺乳者建議用
Propylthiouracil (PTU)優於methimazole
- 老人Alprazolam 用於65 y/o 病患一天劑量不
建議超過2mg
- 幼兒:Ciproxin 不建用於18 y/o以下之病患

給藥方式錯誤

29

途徑

該藥物須依特定之方式投予

- Prochlorperazine 僅可以IM投與，以IV給予可能導致不良副作用發生(EPS)
- Voran IM給，無IV相關臨床安全試驗

使用部位

該藥物須投予於特定的部位

- 如：Ladiol gel(estradiol gel)盡可能塗於前臂，手臂，兩肩，勿抹於乳房，陰部之粘膜
- 用法用量相同的情況下，該藥物須投予於特定的時間

給藥時間

如：Alendronate

常見處方錯誤之型態

其他 行政

30

電腦批
價錯誤

保險給
付規定

其他

常見處方錯誤之型態

- 處方箋錯誤，但無法歸類錯誤者選擇其他
- 批輸時輸入之錯誤，如100mg批成100PC
- 電腦批輸錯誤
(生殖醫學批價人員鍵入藥品)
- 用法用量皆對，但在總量處卻不足或過多
 - a. 開方單位與電腦中之設定不符合
 - b. 輸入錯誤
 - c. 不合保險給付規定

常見處方錯誤之型態

31

□ 藥名輸入錯誤

學名/學名, 學名/商品名, 或商品名/商品名相似者易輸入錯誤

□ 劑型錯誤

tab/cap $\leftrightarrow$ Syrup / oral solution

tab/cap $\leftrightarrow$ injection

tab/cap $\leftrightarrow$ suppository / vaginal tab

MDI, turbuhaler $\leftrightarrow$ oral solution $\leftrightarrow$ nasal solution

$\leftrightarrow$ eye solution

Outline

32

- 藥師在處方中所扮演的角色
- 處方內容
- 處方縮寫用字
- 處方判讀
- 常見處方錯誤之型態
- 如何增進處方判讀能力
- 全民健康保險藥品給付規定
- 問題處方之處理
- 範例

如何增進處方判讀能力

33

- 對藥品的充份基本認識
- 隨時補充新藥資訊
- 隨時可得方便查詢之參考資料
- 敏銳之綜合判讀及思考力
- 經驗之累積

如何增進處方判讀能力

34

醫藥問題諮詢:當無法立即答覆時

利用參考書籍或圖書館資料庫上網搜尋資料。

- 1.參考書籍：處方集、PDR、Matindale、USPDI、AHFS、Drug facts and Comparison、Handbook on Injectable Drugs、Drugs in Pregnancy & Lactation、Applied Therapeutics。
- 2.圖書館資料庫：CCIS、UpToDate、Access pharmacy。
- 3.詢問藥廠相關資訊。

Outline

35

- 藥師在處方中所扮演的角色
- 處方內容
- 處方縮寫用字
- 處方判讀
- 常見處方錯誤之型態
- 如何增進處方判讀能力
- 全民健康保險藥品給付規定
- 問題處方之處理
- 範例

全民健康保險藥品給付通則-1

36

- 一、本保險醫事服務機構申報之藥品，以收載於「全民健康保險用藥品項表」者為限。
- 二、本保險醫療用藥，由保險人就各醫事服務機構已申報之藥品品項及其藥價審查之。但因急救使用未經報備之藥品，可事後再報保險人備查。
- 三、本保險處方用藥，醫師得按保險對象病情需要，每次開給七日以內之藥量。保險人指定之慢性疾病得一次給予三十日以內之用藥量。住院治療之保險對象於出院必須攜回藥品時，其給藥量規定同上。

全民健康保險藥品給付通則-2

37

四、注射藥品之使用原則：

(一)注射藥品使用時機，應以經醫師診斷後，判斷病情需要且病人不能口服，或口服仍不能期待其有治療效果，記明於病歷表者，方得為之。(86/1/1)

(二)因病情需要，經醫師指導使用方法由病人持回注射之藥品。包括：

- Insulin
- CAPD使用之透析液
- CAPD使用之抗生素及抗凝血劑（至多攜回二週）
- G-CSF (如filgrastim；lenograstim) (至多攜回六天)
- 紅血球生成素
- 於醫院內完成調配之靜脈營養輸液(TPN)，可攜回使用
- 類風濕關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬、乾癬性周邊關節炎、乾癬性脊椎病變與克隆氏症病患使用etanercept、adalimumab、abatacept、tocilizumab、opinercept、certolizumab、brodalumab等生物製劑皮下注射劑，經事前審查核准後，在醫師指導下，至多可攜回四週之使用量。
- 生長激素

全民健康保險藥品給付通則-3

38

- 五、使用抗微生物製劑，應優先選用全民健康保險醫療常用第一線抗微生物製劑品名表(附表一)所列者為限。但經微生物培養及藥物敏感試驗確實有效或病情需要者，依本局規定之抗微生物製劑使用原則用藥。
- 六、維生素、荷爾蒙及白蛋白製劑等類藥品之使用，門診以附表三-A及三-B所列醫治病症，住院以特殊病症或施行大手術後必須積極治療者為原則，凡作一般營養補給者，不予給付。

全民健康保險使用維生素、荷爾蒙之醫治病症

39

藥品名稱	醫 治 病 症
維生素A	夜盲症、眼球乾燥症、角膜軟化症、皮膚角化異常症
維生素B ₁ (89/2/1)	維生素B1 (thiamine) 缺乏症、營養吸收障礙症候群 (malabsorption syndrome)、或胰臟炎等需以全靜脈營養劑 (total parenteral nutrition, TPN) 提供營養支持之病患、 酒精戒斷症候群 (alcohol withdrawal syndrome)。
維生素B ₂	口角炎、維生素B2有效之皮膚病
維生素B ₆	妊娠嘔吐 、維生素B6有效之皮膚炎、預防及治療其他藥品所引起神經病變。
維生素B ₁₂	巨球性貧血、缺乏維生素B12引起之血液或神經病變。
維生素C	壞血病
維生素D	佝僂病、 骨軟化症 、 尿毒症腎性骨質病變 、副甲狀腺機能低下
維生素K	缺乏維生素K所致之出血症
菸鹼酸	癩皮症、血脂過高症
葉酸	巨大紅血球貧血症 、服用抗痙劑phenytoin引起之 葉酸缺乏或其預防 。

藥品名稱	醫 治 病 症
女性荷爾蒙	閉經、不孕症、乳癌、前列腺癌、子宮機能性出血、停經後荷爾蒙之補充、腦下垂體疾病引起之無經症、有症狀之更年期症候群
黃體荷爾蒙	流產、子宮機能性出血、不孕症、乳癌、子宮內膜異位、停經後婦女
男性荷爾蒙	乳癌、子宮機能性出血、再生不良性貧血、血小板低下症、腦下垂體功能不足

附表四 全民健康保險使用 Human Albumin 申報表

40

適應症	☐ 休克 (限 50gm)		☐ A 七十歲老人 ☐ B 嬰幼兒 ☐ C 合併心衰竭 ☐ D 其他休克病人已給生理鹽水等		
	☐ 蛋白嚴重流失小於 2.5gm/dL		☐ E 肝硬化症 (每日限 25gm) ☐ F 腎症候群 (每日限 25gm) ☐ G 嚴重燒、燙傷 ☐ H 肝移植 ☐ I 蛋白質流失性腸症		
	☐ 蛋白嚴重流失小於 3.0gm/dL		☐ J 嚴重肺水腫 ☐ K 大量肝切除		
	☐ 開心手術 (限 37.5gm)				
用量	日期	用量 (瓶)	檢驗結果 A/G(gm/dL)	檢查日期	審核結果
	年 月 日				
注意事項	Albumin 值限最近 3 天以內，如係多次注射限上次注射後，最近 3 天內之結果。 每次注射前，務必檢查 Albumin 值，符合條件方可以再注射。				

全民健康保險藥品給付通則-4

八、12歲(含)以下兒童或施行管灌飲食等不適合服用錠劑之病人，得依病情需要使用內服液劑。(94/11/1)

九、本保險處方用藥有下列情況者視為重複用藥，不予給付(87/4/1)：

(一)為達相同之治療目的，使用兩種以上同一治療類別(或作用機轉)之藥品，視為重複用藥。

(二)為達相同之治療目的，使用兩種以上不同治療類別(或作用機轉)之藥品，而未能增加療效；或其併用不符合一般醫學學理，且無文獻佐證者。

(三)但下列情形除外：

1. 長短效的藥品搭配使用或不同劑型配合使用，且其使用方法符合各項藥品藥動學或藥理性質之特色者。

2. 緊急傷病情況下之合併使用者，且其併用符合一般醫學學理。

3. 「全民健康保險藥品給付規定」有特別規定者。

常見之健保規範-NSAID

42

1.1. 疼痛解除劑 Drugs used for pain relief

1.1.1.非類固醇抗發炎劑外用製劑：(88/9/1、92/2/1、94/9/1、109/2/1)

1.外用非類固醇抗發炎軟膏，**不得同時併用口服或其他外用**非類固醇發炎製劑，
每4週至多以處方40gm 為限(94/9/1、109/2/1)。

2.Flurbiprofen 40mg patch (如 Flur Di Fen Patch)：

限同時符合下列條件之病患使用：(92/2/1、109/2/1)

(1)單一關節（部位）或軟組織風濕症。

(2)**不適合口服**非類固醇抗發炎製劑者。

(3)**不得同時併用**口服或其他外用非類固醇發炎製劑，亦**不得開立慢性連續處方**
箋(109/2/1)。

(4)**每4週限處方16片以內**(109/2/1)。

常見之健保規範-降血脂藥物

43

2.6.降血脂藥物 Drugs used for dyslipidemia

2.6.1.全民健康保險降血脂藥物給付規定表（86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1）

全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表

	非藥物治療	起始藥物治療血脂值	血脂目標值	處方規定
1. 有急性冠狀動脈症候群病史 2. 曾接受心導管介入治療或外科冠狀動脈搭橋手術之冠狀動脈粥狀硬化患者 (108/2/1)	與藥物治療可並行	LDL-C $\geq$ 70mg/dL	LDL-C<70mg/dL	第一年應每3-6個月抽血檢查一次，第二年以後應至少每6-12個月抽血檢查一次，同時請注意副作用之產生如肝功能異常，橫紋肌溶解症。
心血管疾病或糖尿病患者	與藥物治療可並行	TC $\geq$ 160mg/dL 或 LDL-C $\geq$ 100mg/dL	TC<160mg/dL 或 LDL-C<100mg/dL	
2個危險因子或以上	給藥前應有3-6個月非藥物治療	TC $\geq$ 200mg/dL 或 LDL-C $\geq$ 130mg/dL	TC<200mg/dL 或 LDL-C<130mg/dL	
1個危險因子	給藥前應有3-6個月非藥物治療	TC $\geq$ 240mg/dL 或 LDL-C $\geq$ 160mg/dL	TC<240mg/dL 或 LDL-C<160mg/dL	
0個危險因子	給藥前應有3-6個月非藥物治療	LDL-C $\geq$ 190mg/dL	LDL-C<190mg/dL	

常見之健保規範-降血脂藥物

44

2.6.降血脂藥物 Drugs used for dyslipidemia

2.6.1.全民健康保險降血脂藥物給付規定表

全民健康保險降三酸甘油酯藥物給付規定表

	非藥物治療	起始藥物治療三酸甘油酯值	三酸甘油酯目標值	處方規定
心血管疾病或糖尿病病人	與藥物治療可並行	TG $\geq$ 200mg/dL 且 (TC/HDL-C $>$ 5 或 HDL-C $<$ 40mg/dL)	TG $<$ 200mg/dL	第一年應每3-6個月抽血檢查一次，第二年以後應至少每6-12個月抽血檢查一次，同時請注意副作用之產生如肝功能異常，橫紋肌溶解症。
無心血管疾病病人	給藥前應有3-6個月非藥物治療	TG $\geq$ 200mg/dL 且 (TC/HDL-C $>$ 5 或 HDL-C $<$ 40mg/dL)	TG $<$ 200mg/dL	
無心血管疾病病人	與藥物治療可並行	TG $\geq$ 500mg/dL	TG $<$ 500mg/dL	

心血管疾病定義：

- (一) 冠狀動脈粥狀硬化患者包含：心絞痛病人，有心導管證實或缺氧性心電圖變化或負荷性試驗陽性反應者(附檢查報告)
- (二) 缺血型腦血管疾病病人包含：1.腦梗塞。2.暫時性腦缺血患者(TIA)。(診斷須由神經科醫師確立)
- 3.有症狀之頸動脈狹窄。(診斷須由神經科醫師確立)

危險因子定義：1.高血壓 2.男性 $\geq$ 45歲，女性 $\geq$ 55歲或停經者 3.有早發性冠心病家族史(男性 $\leq$ 55歲，女性 $\leq$ 65歲) 4.HDL-C $<$ 40mg/dL 5.吸菸(因吸菸而符合起步治療準則之個案，若未戒菸而要求藥物治療，應以自費治療)。

常見之健保規範- 肝庇護劑

45

3.3.1. 肝庇護劑：(85/1/1、88/3/1、94/7/1)

1. 肝硬化、肝炎患者，限下列情形之一者，得由醫師依肝功能和影像檢查或病理切片檢查確實診斷後，視病情需要處方之。(94/7/1)
 - (1) **HBV (+) 及 HCV (+)** 之病患且GOT、GPT值大於(或等於)正常值上限**1倍**以上。
 - (2) 任何原因所引起之**肝硬化**且GOT、GPT值大於(或等於)正常值上限**1倍**以上。
 - (3) **HBV (-) 及 HCV (-)** 之病患，GOT、GPT值大於(或等於)正常值上限**2倍**以上。
2. 肝庇護劑之使用，門診以口服一種為原則；使用於高血氨症(hyperammonemia)之肝庇護劑應檢附氨之異常報告。
3. 使用肝庇護劑應檢附肝功能報告，該報告有效期為**三至六個月**，逾期應再複查。(108/11/1)。
4. 肝功能檢查如檢查結果正常，應停止用藥，**在檢查未得結果前，所用藥物以一週為宜。**

常見之健保規範- 消化性潰瘍用藥

46

□ 2. 使用規定：

- (3) 消化性潰瘍及逆流性食道炎符合洛杉磯食道炎分級表（The Los Angeles Classification of Esophagitis※備註）**Grade A或Grade B**者，欲使用消化性潰瘍用藥，其使用期間以**四個月**為限，申報費用時需檢附**四個月內有效之上消化道內視鏡檢查或上消化道X光攝影報告**，其針劑限使用於消化道出血不能口服之病人急性期替代療法。(92/10/1)
- (4) 經上消化道內視鏡檢查，診斷為重度逆流性食道炎，且符合洛杉磯食道炎分級表（The Los Angeles Classification of Esophagitis※備註）**Grade C或Grade D**者，得經消化系專科醫師之確認後可長期使用消化性潰瘍用藥**一年**。

Outline

47

- 藥師在處方中所扮演的角色
- 處方內容
- 處方縮寫用字
- 處方判讀
- 常見處方錯誤之型態
- 如何增進處方判讀能力
- 全民健康保險藥品給付規定
- 問題處方之處理
- 範例

問題處方之處理

48

□ 優良藥品調劑作業規範(GDP)

三十九、藥事人員經依前條用藥適當性評估後，認為對病患有相關用藥治療問題之虞時，**應該主動與開立處方的醫師聯絡**，請其確認或重新開立處方。前項過程皆應記錄在處方或加註於藥品治療問題專用紀錄表上，並註明與醫師討論的時間。

□ 藥師調劑過程發現醫師之處方箋藥品有問題時，應積極與醫師進行溝通詢問確認後，加以記錄備查。如為問題之處方，可列入藥物錯誤（medication error）於**院部醫療會議或病人安全會議中提報**。

Outline

49

- 藥師在處方中所扮演的角色
- 處方內容
- 處方縮寫用字
- 處方判讀
- 常見處方錯誤之型態
- 如何增進處方判讀能力
- 全民健康保險藥品給付規定
- 問題處方之處理
- 範例

Practice-1

50

臺北醫學大學附設醫院

第1頁,共1頁

健保欠卡

處方箋繳費通知單

看診日期：100/10/03 批價序號：O010-06897 病歷號：1103854-2

姓名：陳 身分證： 5581 性別：女 年齡：44歲9個月

生日：民國 055/12/06 科別：婦產科 醫師：王國華 體重 58.0 kg

診斷：1. CYST OF BARTHOLIN 4. CONSTIPATION

2. OTHER CELLULITIS AND ABSCESS, 5.

3. CANDIDIASIS OF VULVA AND VAGINÆ.

藥品名稱	次量	單位	用法	頻率	天	總量	單位	自	調
Spersin Oint 10g 使皮新軟 (Neomycin Sulphate; Bacitracin Zinc; Polymyxin Sulphate)	1 qs		TOPI	BID	7	1 Tube	N	N	
Bonas 百炎施 (Bromelain)	1 Tab		PO	TID	7	21 Tab	N	N	
Curam F.C. 1g 諾快寧膜衣 (Amoxicillin, clavulanic acid)	1 Tab		PO	TID	7	21 Tab	N	N	
Suwell 舒胃錠 (Mg(OH)2, Al(OH)3, Simethicone)	1 Tab		PO	TID	7	21 Tab	Y	N	

共4筆

Objective :

.PUS culture: E-coli.

PV: bartholian abscess , L'T involved margin of annus

area.

marsupialization was done. (99-4-21)

MDR: _____

領藥號： _____

* 為保障病患用藥安全，請憑處方箋於3天內領藥

請攜帶本單至第三大樓一樓批價櫃檯或其他臨近櫃檯結帳

本院地址：臺北市信義區吳興街252號 電話：(02)2737-2181



Practice-2

51

臺北醫學大學附設醫院

自費身份 處方箋暨繳費通知單(修正)4

看診日期：102/06/27 批價序號：O218-06824 病歷號：076

姓名：楊 身分證：R12 性別：男 年齡：47歲3個月

生日：民國 055/03/13 科別：腸胃內科 醫師：潘憲 體重 68.0 kg

診斷：1. PEPTIC ULCER, SITE UNSPECIFIED 4.

2. 5.

3. 6.

藥品名稱	次量	單位	用法	頻率	天	總量	單位	自	調
Amoxicillin 250mg 安莫西 (Amoxicillin)	5	Cap	PO	BIDAC	7	56	Cap	Y	N
Klaricid F.C 500mg/Tab 開 (Clarithromycin)	1	Tab	PO	BIDAC	7	14	Tab	Y	N
Takepron OD Tab 30mg 泰 (Lansoprazole)	1	Tab	PO	BIDAC	7	14	Tab	Y	N
self-pay for triple therapy 共3筆									

Objective :

PE: n.p.

102/5/6 13C-UBT RESULT: Positive(+)

102/6/14 PES: Erosion, Stomach

Practice-3

52



20618025106072814491004

列印時間: 106/7/29 15:18

第 1-1 頁

臺北醫學大學附設醫院

領藥單(補印)

床號: 7B192 姓名: 莊 [redacted] *防跌 病歷號: 1 [redacted] 性別: 男 年齡: 69
 科別: 成人感染 主治醫師: 李垣樟 開單醫師: 李垣樟020 領藥號: 1004
 診斷: 1. 身高: 體重:
 2. 4.
 3. 5.

醫令日期/時間	囑 型	藥品名稱	磨 粉	劑量單位 頻次	自發 途徑費藥量
106/07/28 14:49	首	THROUGH F.C. 12mg 便通		1.00Tab QN	PO N 1
106/07/28 14:49	首	Catilon 40mg 腸必寧錠		1.00Tab TID	PO N 3
106/07/28 14:49	首	Takepron OD Tab 30mg 泰		1.00Tab QD AC	PO Y 1
106/07/28 14:49	首	大塚 Norm-Saline 500mL/t		3.00Bot QD	IV N 3

註:長期藥囑首日藥量計算到下次過藥日16:59以前。
 一般過藥日為隔日,週六過二天。

Practice-4

53



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY



日期/時間：[健保] <門診藥局>

Date / Time: 1060504 20:02 看診日: 1060504 13:55

藥袋數:

Package No.: 1 / 2

病歷號:

Medical History No.: 1

床號:

Bed No.: 門診

領藥號:

Prescription No.: 2090

姓名:

Patient Name: 李

先生

性別: 男

Gender: 男

生日:

Birth Date: 民國 041/04/14

(年齡 65 歲)

用法/用量:

Usage and Dosage: 口服

配藥天數:

Treatment Duration: 28 日份

睡前使用

0.5 粒

藥名:

Drug Name: 【4】 Doxaben XL 4mg/tab ★

發藥量:

Drug Quantity: 28 粒

可迅持續性藥效錠

成分名:

Generic Name: Doxazosin

(4*7)

臨床用途:

Clinical Uses: 心臟血管、前列腺疾病

注意事項: 1. ★為高警訊藥品，務請遵照醫師指示使用 2. 服藥後避免快速起立或改變姿勢 3. 不可咬碎、磨粉。

藥品外觀標記: 白色，圓形，錠劑，大小

Drug Appearance: 0.9公分; 標記:

[CXL4]

常見副作用:

Adverse Effects: 口乾、腹痛、噁心、頭暈

☐ 早上 (Morning)	☐ 中午 (Noon)	☐ 晚上 (Night)	☒ 睡前 (Bedtime)
☐ 飯前 (Before meals)	☐ 飯後 (After meals)	☐ 一和	☒ 半粒

就診科別:

Medical Division: 心臟血管

處方醫師:

Prescribing Physician: 黃群耀 醫師

調劑藥師:

Dispensing Pharmacist: 許翠芸 藥師

覆核藥師:

Verified Pharmacist: 陳詩涵 藥師

請核對姓名、藥袋總數、藥品名稱、外觀及數量;並注意效期，未標示者為3個月。

Please verify your identification (name, medical history No. and prescription No.) and drug information (total package number, drug name, appearance and quantity). The expiration date is usually three months unless labeled otherwise on the package.

No.252, Wuxing St., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan 24-hour consultation tel. (02)2737-2181 ext. 8130, 8434

台北市信義區吳興街252號 24小時用藥諮詢專線(02)2737-2181 分機8130、8434

Practice-5

54



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY



日期/時間: [健保] <門診藥局>

Date / Time: 1060719 19:00 看診日: 1060719 18:55

藥袋數:

Package No.: 3 / 3

病歷號:
Medical History No.: 0

床號: 門診
Bed No.:

領藥號: 1979
Prescription No.:

姓名: 孔
Patient Name:

女士

性別: 女
Gender:

生日: 民國 026/03/25
Birth Date (年齡 80 歲)

用法/用量:
Usage and Dosage: 口服

每天1次, 固定時間使用

配藥天數: 28 日份
Treatment Duration:

1 毫升

藥名: Duphalac 666mg/mL, 300mL/bot 杜化液
Drug Name:

發藥量: 1 瓶
Drug Quantity:

成分名: Lactulose
Generic Name:

臨床用途: 緩瀉, 降腦氨劑
Clinical Uses:

注意事項: 本藥品需儲存於25度C以下
Precautions:

藥品外觀標記: 白色瓶裝, 黃色澄清黏稠
Drug Appearance: 液體

常見副作用: 腹部絞痛、腹脹、高血糖、噁心
Adverse Effects:

☐ 早上 (Morning)	☐ 中午 (Noon)	☐ 晚上 (Night)	☐ 睡前 (Bedtime)
☐ 飯前 (Before meals)	☐ 飯後 (After meals)	☒ 一粒	☐ 半粒

就診科別: 神經外科
Medical Division:

處方醫師: 蔣永孝 醫師
Prescribing Physician:

調劑藥師: 羅涵尹 藥師
Dispensing Pharmacist:

覆核藥師: 陳柏諺 藥師
Verified Pharmacist:

請核對姓名、藥袋總數、藥品名稱、外觀及數量; 並注意效期, 未標示者為3個月。
Please verify your identification (name - medical history No. and prescription No.) and drug information (total package number, drug name, appearance and quantity). The expiration date is usually three months unless labeled otherwise on the package.
No.252, Wuxing St., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan 24-hour consultation tel. (02)2737-2181 ext. 8130, 8434

台北市信義區吳興街252號 24小時用藥諮詢專線(02)2737-2181 分機8130、8434

**THANKS FOR
YOUR ATTENTION**